





Skinsept® Mucosa

## SCHLEIMHAUTANTISEPTIK AUF BASIS VON CHLORHEXIDIN

- ▲ Schonend
- ▲ Sicher
- ▲ Iodfrei



# Skinsept® Mucosa

SCHLEIMHAUTANTISEPTIK AUF BASIS VON CHLORHEXIDIN

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Umfassendes Wirkspektrum gegen auf Schleimhäuten vorkommende Mikroorganismen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bakterizid (inkl. MRSA)</li> <li>• Levurozid</li> <li>• Wirksam gegen HIV</li> <li>• Wirksam gegen Herpes simplex Viren Typ 2</li> </ul>	Zuverlässige Schleimhautantiseptik gibt Sicherheit in allen Bereichen der Klinik und Praxis
Optimale Formulierung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zusatz von Milchsäure</li> <li>• Remanenzwirkung</li> <li>• Autosterilität</li> <li>• Optimale Viskosität</li> <li>• Ohne Zusatz von Farbstoffen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abgestimmt auf den physiologischen pH-Wert der Schleimhaut</li> <li>• Garantierter Schutz über einen längeren Zeitraum durch den Wirkstoff Chlorhexidin</li> <li>• Keine Kontamination des Produkts auch bei mehrmaligem Öffnen</li> <li>• Verlängert die Verweildauer des Präparats auf der zu behandelnden Schleimhaut</li> <li>• Keine optische Beeinträchtigung des behandelten Areals</li> <li>• Keine Verfleckung von Wäsche und Fußböden</li> </ul>
Iodfrei	Auch bei Patienten mit Iodallergie anwendbar

Anwendungsbereich	Anwendungsempfehlung
Schleimhautantiseptik von oberflächlichen Schleimhäuten und angrenzender Haut im <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaginalbereich</li> <li>• Glans penis</li> <li>• Orificium urethrae externum</li> </ul> Zur Anwendung im Mund- und Rachenraum	Einmalig Lösung unverdünnt bis zur vollständigen Benetzung auftragen und mindestens 60 Sekunden einwirken lassen
Anwendungszeitraum max. 2 Monate	

Produkte




+

Dosierung



+

Service



=

Sicherheit



UNSERE HYGIENELEISTUNGEN SCHÜTZEN LEBEN ...

Worldwide Headquarters  
370 Wabasha Street N  
St. Paul, MN 55102  
[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

Regional Office  
Ecolab Deutschland GmbH  
Reisholzer Werftstr. 38-42  
40589 Düsseldorf  
Phone +49 (0) 211 98 93-0  
Fax +49 (0) 211 98 93-174  
[www.ecolabhealthcare.de](http://www.ecolabhealthcare.de)

Regional Office  
Ecolab Schweiz GmbH  
Kriegackerstr. 91  
CH-4132 Muttenz  
Phone +41 (0) 614 66 94-66  
Fax +41 (0) 614 66 94-55  
[www.ecolab-suisse.ch](http://www.ecolab-suisse.ch)

## EINSATZBEREICHE

- ▲ Zur antiseptischen Behandlung oberflächlicher Schleimhäute und angrenzender Haut
- ▲ Zur Mund- und Rachendekontamination bei MRSA kolonisierten Patienten

## GUTACHTEN

Umfangreich geprüft: mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

## BESTELLINFORMATIONEN

Skinsept® Mucosa	30 038 70
PZN	74 247 14
Spenderflasche	12 x 500 ml
Skinsept® Mucosa	30 038 80
PZN	74 247 08
Spenderflasche	12 x 1 L

**Zusammensetzung:** 100 g Skinsept® Mucosa Lösung enthalten: 10,4 g Ethanol (96 %), 1,67 g Wasserstoffperoxid-Lösung (30 %), 1,50 g Chlorhexidinbis(D-gluconat). **Sonstige Bestandteile:** Milchsäure, Macrogolglycerolhydroxystearat, Povidon, Geruchsstoffe, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. **Indikationsgruppe:** Schleimhautantiseptikum. **Anwendungsgebiete:** Zur antiseptischen Behandlung von oberflächlichen Schleimhäuten und angrenzender Haut im Vaginalbereich, Glans penis, Orificium urethrae externum, wenn eine Keimzahlverminderung erforderlich ist, und im Mund- und Rachenraum. **Gegenanzeigen:** Nicht anzuwenden bei Säuglingen und Kleinkindern wegen bisher fehlender Erfahrungen. Nicht auf großflächigen Wunden anwenden; nicht in Auge und Ohr bringen. Skinsept® Mucosa sollte nicht in der Bauchhöhle (z.B. intraoperativ) und auf Nasen- und Bronchialschleimhäuten angewendet werden. Nicht bei bekannter Allergie gegen die Inhaltsstoffe anwenden. Zur oralen Anwendung bei Alkoholkranken aufgrund des Ethanol-Gehaltes nicht geeignet. **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Nicht zusammen mit anionischen Tensiden anwenden, da dies zur Inaktivierung der Wirkstoffe führen kann. **Warnhinweise:** Dieses Arzneimittel enthält 12,4 Vol. % Alkohol. **Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:** Anwendung auf oberflächlichen Schleimhäuten und angrenzender Haut; wenn nicht anders vom Arzt verordnet, einmalig Lösung unverdünnt bis zur vollständigen Benetzung auftragen und mindestens 60 Sekunden einwirken lassen. Anwendung im Mund- und Rachenraum; wenn nicht anders vom Arzt verordnet, 1-2 mal täglich mit unverdünnter Lösung (ca. 1 Esslöffel voll) mindestens 60 Sekunden lang spülen bzw. gurgeln, Anwendungszeitraum maximal 2 Monate. Bei Fragen zur Klärung der Anwendung bitte den Arzt oder Apotheker befragen. **Nebenwirkungen:** Allergische Reaktionen auf die Inhaltsstoffe sind in sehr seltenen Fällen nicht auszuschließen; gelegentlich leichtes Brennen möglich. Vorübergehende Geschmacksbeeinträchtigungen können in seltenen Fällen auftreten. Reversible Verfärbungen der Zähne, Zunge und Mundschleimhaut wurden bisher nicht beobachtet, sind jedoch für chlorhexidinhaltige Präparate bei längerfristiger Anwendung beschrieben. Bitte jede Nebenwirkung, die nicht in der Gebrauchsinformation aufgeführt ist, unbedingt dem Arzt oder Apotheker mitteilen. **Hinweise:** Nach Anbruch 8 Wochen haltbar. Arzneimittel nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden. Arzneimittel sachgerecht entsorgen. **Zulassungsnummer:** 18839.00.00.